

AIDE A LA PRESCRIPTION DE NALOXONE

Document du CEIP-Addictovigilance PACA Corse destiné à tous les médecins

Pourquoi prescrire de la naloxone ?


- Les médicaments opioïdes peuvent être responsables de surdoses
- La naloxone est l'antidote spécifique des opioïdes
- Des formes « prêtes à l'emploi » sont utilisables par tous

Quand en prescrire ?



La Haute Autorité de Santé (HAS) [recommande](#) d'évaluer systématiquement la pertinence d'une prescription de naloxone prête à l'emploi, lors de la prescription d'un opioïde (1). Et ce, quel que soit l'opioïde : antalgiques de palier 2 ou 3, médicaments de substitution aux opioïdes, substances illicites.

(1) Les recommandations de bonne pratique : « Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses »

Certaines situations à risque de surdose

-  **Initiation de traitement, perte de tolérance aux opioïdes (après un arrêt ou une diminution des prises d'opioïdes)**
-  **Patients recevant un médicament de substitution aux opioïdes (méthadone ou buprénorphine)**
-  **Patients présentant une dépendance physique**
-  **Patients avec antécédents de surdoses d'opioïdes**
-  **Patients en mésusage ou trouble de l'usage de médicaments opioïdes : augmentation des doses, recherche d'effets psychoactif, nomadisme médical, etc.**
-  **Patients souffrant de comorbidités psychiatriques**
-  **Patients exposés à des interactions pharmacologiques : association avec d'autres déprimeurs (autres opioïdes, benzodiazépines, alcool, prégabaline, etc.)**
-  **Patients avec terrain à risque : insuffisants respiratoires, rénaux ou hépatiques, personnes âgées, obésité, patients fébriles, déshydratation, etc..**

BON À SAVOIR Sur la naloxone Prête à l'emploi

	 Nyxoid®	 Prenoxad®
Indication thérapeutique	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de 14 ans	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de 18 ans
Voie d'administration	Intra-nasale : deux pulvérisateurs	Intra-musculaire : une seringue pré-remplie
Composition	2 doses de 1,8 mg de naloxone	5 doses de ~ 0,36 mg de naloxone
Conditions de prescription	<i>Prescription médicale obligatoire</i>	<i>Prescription médicale facultative</i>
Lieux de dispensation	Pharmacie d'officine, CSAPA, hôpital	Pharmacie d'officine, CSAPA & CAARUD, hôpital
Prix et remboursement	31,40€ TTC Taux de remboursement : 65%	22,16€ TTC Taux de remboursement : 65%

Prescription au choix : Prenoxad® ou Nyxoid® sur **ordonnance simple**

Expliquer au patient : les situations à risque de surdose, les signes de surdose, comment utiliser le kit de naloxone, l'intérêt d'en parler à son entourage.

Exemples d'ordonnance type

Nom Prénom du patient. âge

NALOXONE (**NYXOID 1,8mg**, solution nasale pour pulvérisation) : 1 boîte

Administrer par **voie nasale** si signes cliniques en lien avec une surdose aux opioïdes (une dépression respiratoire et/ou une dépression du système nerveux central)

Contacteur les secours 15 ou 112

Dose initiale de 1,8mg administrée dans une narine (un pulvérisateur nasal)

En l'absence d'amélioration après 2 à 3 minutes : utiliser le 2ème pulvérisateur

Si l'état du patient s'améliore à la première administration puis se dégrade : utiliser le 2ème pulvérisateur

Surveiller l'état du patient jusqu'à l'arrivée des secours

Se référer à la notice pour plus d'information

Nom prénom du patient. âge

NALOXONE (**PRENOXAD 0,91mg/ml**, solution injectable en seringue préremplie) : 1 boîte

Administrer par **voie intramusculaire** si signes cliniques en lien avec une surdose aux opioïdes (une dépression respiratoire et/ou une dépression du système nerveux central).

Une seringue contient 5 doses graduées, chaque graduation correspond à une dose de 0,4ml

Contacteur les secours 15 ou 112

Dose initiale : 0,4ml (une graduation)

En l'absence d'amélioration après 2 à 3 minutes : nouvelle dose

Si l'état du patient s'améliore à la première administration puis se dégrade : nouvelle dose

Surveiller l'état du patient jusqu'à l'arrivée des secours

Se référer à la notice pour plus d'information

Pour aller plus loin

Le site du CEIP-Addictovigilance de Marseille dans lequel vous trouverez :

[La foire aux questions sur la naloxone](#)

[Affiches et vidéos sur la naloxone](#)

[Les échelles POMI et ORT](#)

Le site **naloxone.fr**

Les liens vers les laboratoires **prenoxad.fr** pour Prenoxad®
www.mundipharma.fr/nos_medicaments/antidote pour Nyxoid®

Les mesures additionnelles de réduction des risques sur le site de l'ANSM :

Nyxoid® : <https://ansm.sante.fr/tableau-marr/naloxone-1>

Prenoxad® : <https://ansm.sante.fr/tableau-marr/naloxone-2>

Les deux principaux signes d'une surdose opioïde



Dépression respiratoire, fréquence respiratoire <10/minute



Trouble de la conscience, coma, absence de réponse à un bruit fort ou au toucher



Vidéo : Agir en cas de surdose opioïde

<http://fr.ap-hm.fr/site/ceip-addictovigilance-marseille/le-projet-pop#ressources-pop>

Pour tout cas de troubles liés à l'usage d'opioïde, de surdose ou une question

CEIP-Addictovigilance PACA Corse

Tel.: 04 91 38 42 37

addictovigilance@ap-hm.fr

<http://fr.ap-hm.fr/site/ceip-addictovigilance-marseille>